

Materiale informativo-educativo relativo al rischio di infezione da HIV con indicazioni sulla disponibilità del test HIV presso strutture sanitarie diverse dai servizi trasfusionali

LA INVITIAMO A LEGGERE PRIMA DI DONARE!

La lettura attenta del presente materiale informativo, nel suo interesse e nell'interesse dei pazienti, le permetterà di rispondere in modo CONSAPEVOLE E RESPONSABILE alle domande del QUESTIONARIO che le verrà somministrato prima della sua donazione di sangue. In tal modo la sua donazione risulterà sicura per le persone alle quali essa sarà destinata.

I più aggiornati dati epidemiologici ci informano che in Europa stanno riemergendo alcune infezioni sessualmente trasmesse; tra queste, particolare rilevanza assume l'HIV (virus responsabile dell'AIDS).

Sebbene in Italia l'incidenza dell'infezione da HIV sia in lenta ma costante diminuzione, ogni anno nuove diagnosi vengono ancora registrate con maggiore incidenza nelle **popolazioni a rischio**, cioè le persone che si espongono a comportamenti a rischio, soprattutto nella fascia d'età compresa tra **25 e 50 anni** (fonte Centro operativo AIDS, CoA-ISS).

La trasmissione sessuale rappresenta la modalità principale di diffusione dell'HIV in Italia. Inoltre, una parte significativa di persone scopre tardivamente di essere HIV positiva, quando è già in fase avanzata di malattia; questo può accadere perché le persone **non ritengono di essersi esposte** ad un contatto a rischio di trasmissione dell'HIV.

Le Modalità di trasmissione del virus HIV sono:

- i rapporti sessuali non protetti da preservativo;
- il passaggio del virus da madre HIV positiva a feto/neonato (durante la gravidanza, il parto, l'allattamento);
- l'utilizzo di materiale per iniezione non monouso contaminato da sangue infetto.

Analoghe modalità di trasmissione sono responsabili della trasmissione della sifilide, di epatite B ed epatite C.

COMPORAMENTI SESSUALI A RISCHIO

La trasmissione del virus avviene attraverso il contatto tra liquidi biologici infetti (secrezioni vaginali, liquido pre-coitale, sperma, sangue) e mucose orali, vaginali ed anali, anche integre, durante i rapporti sessuali. Ulcerazioni e lesioni dei genitali causate da altre malattie possono far aumentare il rischio di contagio. Sono quindi a rischio di trasmissione HIV e di altre infezioni sessualmente trasmesse i rapporti sessuali (vaginali, anali, oro-genitali) non protetti dal preservativo, nonché il contatto diretto tra genitali in presenza di secrezioni. L'uso corretto del preservativo protegge dalla trasmissione dell'HIV e di altre infezioni sessualmente trasmesse. L'uso improprio o la rottura accidentale del preservativo riduce l'efficacia della protezione.

COSA SUCCEDA DOPO LA SUA DONAZIONE

I TEST PER LA SICUREZZA DEL SANGUE

Per la sicurezza del paziente a cui è destinato, dopo ogni donazione, sul sangue donato vengono eseguiti i test per l'HIV, l'epatite B, l'epatite C e la sifilide. Questi test sono assolutamente sicuri ed accurati, purché il donatore non si trovi nel "periodo finestra" (cioè quel lasso di tempo che

intercorre dal momento dell'infezione alla positivizzazione dei test di laboratorio).

Durante questo periodo il test può essere negativo pur essendo la persona infetta e quindi già in grado di trasmettere l'infezione.

Le chiediamo, pertanto di rispondere in modo **consapevole, e responsabile** al questionario pre-donazione e qualora **si riconoscesse** in uno dei comportamenti a rischio precedentemente illustrati, **le raccomandiamo di sottoporsi al test per l'HIV** in una delle strutture sanitarie accreditate dedicate.

Per saperne di più sull'infezione da HIV, sulle altre infezioni sessualmente trasmesse e sulle strutture dove effettuare i test la invitiamo a consultare il **sito web del Ministero della Salute** <http://www.salute.gov> seguendo il percorso:

HOME → LA NOSTRA SALUTE →
ENCICLOPEDIA SALUTE → INFEZIONI
SESSUALMENTE TRASMESSE → HIV E AIDS

Vi troverà informazioni dettagliate e potrà usufruire di ulteriori strumenti informativi come il Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse



che offre un servizio di *counseling* telefonico, **anonimo e gratuito**, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 18.00

Le ricordiamo che tutte le informazioni che fornirà sono riservate e la stessa riservatezza è garantita in ogni momento del percorso della donazione. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al personale sanitario del Servizio Trasfusionale e delle Unità di Raccolta dove effettuerà la donazione.

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO
TRASFUSIONALE/ASSOCIAZIONE





SOC SIMT-VCO

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

COMUNICATO AIDS

PREMESSA

Gent.mo Candidato Donatore, ringraziandola per aver compreso tra gli obblighi morali di una persona umana anche il dono del sangue, le segnaliamo quanto il dono implichi anche una responsabilità relativa al rischio di trasmissione di malattie infettive.

L'AIDS è una malattia infettiva contagiosa trasmessa da due tipi di virus HIV1-2. La sua trasmissione avviene attraverso contatti sanguigni e rapporti sessuali. Non si conoscono oggi cure realmente efficaci per i malati di AIDS in grado di portare a guarigione e pertanto il più grande impegno deve essere posto nella **PREVENZIONE DEL CONTAGIO**.

Il sangue prelevato ai Donatori a scopo trasfusionale viene analizzato tutte le volte per la ricerca del Virus e degli anticorpi ANTI-HIV che segnalano avvenuto contagio. Purtroppo però:

L'Assenza di anticorpi ANTI-HIV e la negatività al test per la ricerca del virus (NAT) non garantiscono in maniera assoluta la non infettività del sangue

Tra il contagio e la comparsa degli anticorpi esiste un intervallo della durata di 1-4 mesi e durante questo periodo di tempo, chiamato "*periodo finestra*"

Il sangue pur essendo sieronegativo può trasmettere l'infezione!

COMPORTAMENTI A RISCHIO INFETTIVO

Esclusione per 4 mesi dalla donazione

- **Rapporti sessuali:** con soggetti sieropositivi, conviventi di siero positivi, tossicodipendenti, conviventi di tossicodipendenti, prostitute, persone sconosciute in generale.
- **Trasfusione di sangue e o emoderivati** (quali fattori della coagulazione).
- **Contatti accidentali con materiale potenzialmente infetto:** aghi e siringhe, endoscopie

VALUTAZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, questa comunicazione vuole essere il punto di partenza per una serena valutazione da effettuarsi durante la visita di controllo, consapevoli che il medico è tenuto al più rigoroso segreto professionale nell'interesse sia del donatore che del paziente a cui occorre garantire la massima sicurezza trasfusionale.

Il donatore deve essere consapevole che le sue comunicazioni in merito ai comportamenti a rischio più sopra elencati, risultano indispensabili per la sicurezza di coloro che riceveranno il sangue ed i suoi derivati.

Nel caso di comportamenti a rischio di contagio il donatore con la firma sottostante sottoscrive l'obbligo alla AUTOESCLUSIONE

Rinuncia spontanea alla donazione per cui si è presentato.

Data

IL CANDIDATO DONATORE

.....

ALL 01 PO 01-CT 20



una sanità in salute fa bene a tutti